

ऐडविल गोलियां, छोटी गोलियां व जेल्ल वाली छोटी गोलियां



निर्देश

बालिंग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 या 2 गोलियां, छोटी गोलियां अथवा जेल्ल वाली छोटी गोलियां लें। डाक्टर के कहे बिना 24 घण्टे में 6 गोलियों, छोटी गोलियों अथवा जेल्ल वाली छोटी गोलियों से अधिक न लें। 12 वर्ष तथा कम आयु के बच्चे चिल्ड्रं ऐडविल (Children's Advil) लें।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में दवा इतनी मात्रा में है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसलिक ऐसिड (ऐ.ऐस.ऐ.) अथवा आईबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं, या आपको ऐ.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा इनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो ऐडविल (उदवलि) न लें। अगर आपको पेट में अल्सर, खून का अधिक दबाव, दिल, गुरदों या जिगर की बीमारी, या कोई अन्य गंभीर बीमारी हो या आप कोई अन्य दवा ले रहे हों तो ऐडविल लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श कर लें। अगर आप गर्भवती हों या बच्चे को स्तनपान कराते हों डाक्टर के कहे बिना ऐडविल न लें। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें। डाक्टर के कहे बिना सिफारिश की गई मात्रा से अधिक न लें।

अगर ऐडविल लेने के दौरान पेट दर्द, छाती में जलन, उबकाई या उल्टी आना, पेट फूले जैसा महसूस होना, दस्त, कब्ज, कानों में आवाज़ गुंजना, घबराहट, नींद न आना, चक्कर आना, दृष्टि में कोई परिवर्तन, तरल बड़ जाना, खुजली होना, चमड़ी पर लाल निशान पड़ना, या कोई अन्य बुरा प्रभाव महसूस हो या कोई ऐसे लक्षण उभरें जिनके कारणों का पता न चले तो तुरंत दवा लेना छोड़ कर किसी डाक्टर से प्रामर्श लें। अगर आवश्यकता से अधिक दवा ली जाए तो तुरंत पुआयेज़न कंट्रोल सेंटर या डाक्टर से संपर्क करें चाहे कोई लक्षण उभर कर सामने न भी आए।

गोलियों व छोटी गोलियों में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

ऐसिटिलेटिड मोनोगलिसराइडों, मधुमक्खी का मोम, कैरानावा मोम, मक्की का नशास्ता, क्रोसकारमैल्लोज़ सोडीअम, ईथोक्सीडीथैनल, आयरन आक्साईड, लैसीथिन, माईक्रोक्रिस्टैलाईन सैल्यूलोज़, पैराबेन, दवाओं में उपयोग की जाने वाली पालिश, दवाओं में उपयोग की जाने वाली शैल्लक, पोवीडोन, प्री-जिलैटीनाईज़ड नशास्ता, मिलीकन डाईआक्साईड, सिमैथीकोन, सोडीअम बैन्ज़ोएट, सोडीअम लाओरिल सलफ़ेट, स्टीअरिक ऐसिड, स्यूक्रोज़, टाईटेनियम डाईआक्साईड।

जेल्ल वाली गोलियों में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

मक्की का नशास्ता, क्रोसकारमैल्लोज़ सोडीअम, ऐफ.डी. एण्ड सी. रेड नम्बर 40, ऐफ.डी. एण्ड सी. यैलो नम्बर 6, जिलैटिन, ग्लिसरीन, हाईपरमैल्लोज़, आयरन आक्साईड, मीडियम चैन ट्राईग्लिसराइडें, प्री-जिलैटीनाईज़ड नशास्ता, प्रोपाईल गैलेट, प्रोपाईलीन ग्लाइकल, मिलीकन डाईआक्साईड, सोडीअम लाओरिल सलफ़ेट, स्टीअरिक ऐसिड, टाईटेनियम डाईआक्साईड, ट्रायेस्टिन।

ऐडविल ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ छोटी गोलियां



निर्देश

बालिंग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 छोटी गोली लें। डाक्टर के कहे बिना 24 घण्टे में 3 छोटी गोलियों से अधिक न लें। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे चिल्ड्रं ऐडविल (Children's Advil) लें।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में दवा इतनी मात्रा में है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसलिक ऐसिड (ऐ.ऐस.ऐ.) अथवा आईबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं, या आपको ऐ.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा इनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो ऐडविल (उदवलि) न लें। अगर आपको पेट में अल्सर, खून का अधिक दबाव, दिल, गुरदों या जिगर की बीमारी, या कोई अन्य गंभीर बीमारी हो या आप कोई अन्य दवा ले रहे हों तो ऐडविल लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श कर लें। अगर आप गर्भवती हों या बच्चे को स्तनपान कराते हों डाक्टर के कहे बिना ऐडविल न लें। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें। डाक्टर के कहे बिना सिफारिश की गई मात्रा से अधिक न लें।

अगर ऐडविल लेने के दौरान पेट दर्द, छाती में जलन, उबकाई या उल्टी आना, पेट फूले जैसा महसूस होना, दस्त, कब्ज, कानों में आवाज़ गुंजना, घबराहट, नींद न आना, चक्कर आना, दृष्टि में कोई परिवर्तन, तरल बड़ जाना, खुजली होना, चमड़ी पर लाल निशान पड़ना, या कोई अन्य बुरा प्रभाव महसूस हो या कोई ऐसे लक्षण उभरें जिनके कारणों का पता न चले तो तुरंत दवा लेना छोड़ कर किसी डाक्टर से प्रामर्श लें। अगर आवश्यकता से अधिक दवा ली जाए तो तुरंत पुआयेज़न कंट्रोल सेंटर या डाक्टर से संपर्क करें चाहे कोई लक्षण उभर कर सामने न भी आए।

ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

मक्की का नशास्ता, क्रोसकारमैल्लोज़ सोडीअम, हाईड्रोक्सीप्रोपाईल मैथिलसैल्यूलोज़, आयरन आक्साईड, लैसीथिन, दवाओं में उपयोग की जाने वाली शैल्लक, पौलीइथाईलिन ग्लाइकोल, प्री-जिलैटीनाईज़ड नशास्ता, मिलीकन डाईआक्साईड, सिमैथीकोन, सोडीअम लाओरिल सलफ़ेट, स्टीअरिक ऐसिड, टाक, टाईटेनियम डाईआक्साईड।

ऐडविल लिक्वी-जेल्ल व ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ



ऐडविल लिक्वी-जेल्ल (200 मि.ग्र.) के लिए निर्देश

बालिंग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: माईग्रेन वाले सर दर्द के लिए आवश्यकता अनुसार दर्द आरंभ होते ही तथा प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 या 2 लिक्वी-जेल्ल लें। बाकी सभी प्रकार के उपयोग के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे में 1 या 2 लिक्वी-जेल्ल लें। डाक्टर के कहे बिना 24 घंटे में 6 लिक्वी जेल्ल से अधिक न लें। 12 वर्ष व कम आयु के बच्चों को चिल्ड्रं ऐडविल (Children's Advil) का उपयोग करना चाहिए।

ऐडविल ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ लिक्वी-जेल्ल (400 मि.ग्र.) के लिए निर्देश

बालिंग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: माईग्रेन वाले सर दर्द के लिए आवश्यकता अनुसार दर्द आरंभ होते ही तथा प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ लिक्वी-जेल्ल लें। बाकी सभी उपयोग करने वाले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे बाद 1 ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ लिक्वी-जेल्ल लें। डाक्टर के कहे बिना 24 घण्टे में 3 ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ लिक्वी-जेल्ल से अधिक न लें। 12 वर्ष तथा कम आयु के बच्चों को चिल्ड्रं ऐडविल (Children's Advil) का उपयोग करना चाहिए।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में दवा इतनी मात्रा में है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसलिक ऐसिड (ऐ.ऐस.ऐ.) अथवा आईबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं, या आपको ऐ.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा इनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो ऐडविल (उदवलि) न लें। अगर आपको पेट में अल्सर, खून का अधिक दबाव, दिल, गुरदों या जिगर की बीमारी, या कोई अन्य गंभीर बीमारी हो या आप कोई अन्य दवा ले रहे हों तो ऐडविल लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श कर लें। अगर आप गर्भवती हों या बच्चे को स्तनपान कराते हों डाक्टर के कहे बिना ऐडविल न लें। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें। डाक्टर के कहे बिना सिफारिश की गई मात्रा से अधिक न लें।

अगर ऐडविल लेने के दौरान पेट दर्द, छाती में जलन, उबकाई या उल्टी आना, पेट फूले जैसा महसूस होना, दस्त, कब्ज, कानों में आवाज़ गुंजना, घबराहट, नींद न आना, चक्कर आना, दृष्टि में कोई परिवर्तन, तरल बड़ जाना, खुजली होना, चमड़ी पर लाल निशान पड़ना, या कोई अन्य बुरा प्रभाव महसूस हो या कोई ऐसे लक्षण उभरें जिनके कारणों का पता न चले तो तुरंत दवा लेना छोड़ कर किसी डाक्टर से प्रामर्श लें। अगर आवश्यकता से अधिक दवा ली जाए तो तुरंत पुआयेज़न कंट्रोल सेंटर या डाक्टर से संपर्क करें चाहे कोई लक्षण उभर कर सामने न भी आए।

ऐडविल लिक्वी-जेल्ल (200 मि.ग्र.)

में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

ऐफ.डी. एण्ड सी. ग्रीन नम्बर 3, जैलेटिन, पौलीइथाईलिन ग्लाइकल, पौलीवाईनिल ऐसीटेट थैलेट, पोटाशियम हाईड्राक्साईड, प्रोपाईलीन ग्लाइकल, शूद्र किया जल, सोरबीटैन, सोरबीटोल, टाईटेनियम डायआक्साईड।

ऐडविल ऐक्सट्रा स्ट्रेन्थ लिक्वी-जेल्ल (400 मि.ग्र.)

में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

जैलेटिन, आयरन आक्साईड, लैसीथिन, मीडियम चैन ट्राईग्लिसराइडज़, पौलीइथाईलिन ग्लाइकल, पौलीवाईनिल ऐसीटेट थैलेट, पोटाशियम हाईड्राक्साईड, प्रोपाईलीन ग्लाइकल, शूद्र किया जल, सोरबीटैन, सोरबीटोल