



兒童 Advil®

退燒功效達 **8** 小時



Advil 兒科滴劑
每5毫升含200毫克布洛芬

兒童 Advil 藥水
每5毫升含100毫克布洛芬

**輕度藥力
Advil 嚼用片**
每片含100毫克布洛芬

年齡	體重		服用量			
	公斤	磅	毫升	毫升	茶匙	片
0 至 3 個月	2.5 至 5.4	5.5 至 11.9	請諮詢醫生	-	-	-
4 至 11 個月	5.5 至 7.9	12 至 17.5	1.0 毫升	-	-	-
12 至 23 個月	8.0 至 10.8	18 至 23	1.4 毫升	-	-	-
2 至 3 歲	10.9 至 15.9	24 至 35	3.0 毫升	6.0 毫升	1 ¼ 茶匙	1
4 至 5 歲	16.0 至 21.3	36 至 47	-	10 毫升	2 茶匙	1 ½
6 至 8 歲	21.4 至 26.7	48 至 59	-	12.5 毫升	2 ½ 茶匙	2
9 至 10 歲	26.8 至 32.5	60 至 71	-	15.0 毫升	3 茶匙	2 ½
11 至 12 歲	32.6 至 43.0	72 至 95	-	19.0 毫升	3 ¾ 茶匙	3
在可能情況下，以體重對比服用量；否則以年齡作對比。除非獲醫生建議，切勿服食超過建議之服用量。避免兒童接觸及自行取用。			6至8小時服用一次 每天最多3次	6至8小時服用一次 每天最多3次	6至8小時服用一次 每天最多4次	

Advil® 兒科滴劑

Advil兒科滴劑適用於兒童，退燒功效達8小時，同時可舒緩因免疫系統、耳痛、感冒及喉痛所引起的痛楚。

● **注意事項：**避免兒童接觸及自行取用。如痛楚或發燒持續三天以上，請延醫診治。假如兒童因嘔吐、腹瀉或缺水而引致脫水(嚴重水份流失)，或患有腎病或肝病，切勿服用此藥。除非獲醫生建議，切勿服食超過建議之服用量。

警告：兒童凡服食阿士匹林(ASA)或其他含布洛芬的食品，切勿給予服用。任何人服食ASA、其他水楊酸鹽或消炎藥後產生過敏反應(呼吸困難、腫脹、麻疹或休克)，均切勿服用。如有服食過量情況，就算沒有任何症狀，亦應即時致電毒藥控制中心或延醫診治。查詢更多資料，請參閱盒內之說明單張。

(不含染色素)

非藥性成份：人造調味料、檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

(水果味)

非藥性成份：人造調味料、檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、FD&C紅色40號色素、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

(提子味)

非藥性成份：人造調味料、檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、FD&C藍色1號色素、FD&C紅色40號色素、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

兒童 Advil® 藥水

兒童Advil適用於兒童，退燒功效達8小時，並舒緩因免疫系統、耳痛、感冒及喉痛所引起的痛楚。

● **注意事項：**避免兒童接觸及自行取用。如痛楚或發燒持續三天以上，請延醫診治。假如兒童因嘔吐、腹瀉或缺水而引致脫水(嚴重水份流失)，或患有腎病或肝病，切勿服用此藥。除非獲醫生建議，切勿服食超過建議之服用量。

警告：兒童凡服食阿士匹林(ASA)或其他含布洛芬的食品，切勿給予服用。任何人服食ASA、其他水楊酸鹽或消炎藥後產生過敏反應(呼吸困難、腫脹、麻疹或休克)，均切勿服用。如有服食過量情況，就算沒有任何症狀，亦應即時致電毒藥控制中心或延醫診治。查詢更多資料，請參閱盒內之說明單張。

(不含染色素)

非藥性成份：人造調味料、檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

(水果味)

非藥性成份：人造調味料、檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、FD&C紅色40號色素、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

(提子味)

非藥性成份：檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、FD&C藍色1號色素、FD&C紅色40號色素、人造調味料、甘油、微晶纖維素、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

(藍樹莓味)

非藥性成份：檸檬酸、乙二胺四乙酸二鈉、FD&C藍色1號色素、甘油、微晶纖維素、天然及人造調味料、聚山梨酯80、苯甲酸鈉、羧甲基纖維素鈉、檸檬酸鈉、山梨糖醇、蔗糖、水、黃原膠

輕度藥力 Advil® 嚼用片

輕度藥力Advil適用於兒童，退燒功效達8小時，並舒緩因免疫系統、耳痛、感冒及喉痛所引起的痛楚。

● **注意事項：**避免兒童接觸及自行取用。如痛楚或發燒持續三天以上，請延醫診治。假如兒童因嘔吐、腹瀉或缺水而引致脫水(嚴重水份流失)，或患有腎病或肝病，切勿服用此藥。除非獲醫生建議，切勿服食超過建議之服用量。

警告：兒童凡服食阿士匹林(ASA)或其他含布洛芬的食品，切勿給予服用。任何人服食ASA 其他水楊酸鹽或消炎藥後產生過敏反應(呼吸困難、腫脹、麻疹或休克)，均切勿服用。如有服食過量情況，就算沒有任何症狀，亦應即時致電毒藥控制中心或延醫診治。查詢更多資料，請參閱盒內之說明單張。

(水果味)

非藥性成份：阿斯巴甜(糖精)、苯二甲酸醋酸纖維素、D&C紅色27號沉澱色、FD&C紅色40號沉澱色、骨膠、magnasweet增甜劑、硬脂酸鎂、甘露糖醇、微晶纖維素、天然及人造調味料、二氧化矽、羧基乙酸澱粉鈉

(提子味)

非藥性成份：阿斯巴甜(糖精)、苯二甲酸醋酸纖維素、D&C紅色30號沉澱色、FD&C藍色2號沉澱色、骨膠、magnasweet增甜劑、硬脂酸鎂、甘露糖醇、微晶纖維素、天然及人造調味料、二氧化矽、羧基乙酸澱粉鈉