



# Advil<sup>®</sup> pour enfants

Soulage la fièvre pendant

**8 HEURES**



**Gouttes  
pédiatriques Advil**  
200 mg / 5 ml d'ibuprofène

**Suspension Advil pour  
enfants**  
100 mg / 5 ml d'ibuprofène

**Comprimés à  
croquer Advil Junior**  
100 mg d'ibuprofène / comprimé

Âge	Poids		Posologie			
	kg	lb	ml	ml	cuillerées à thé	Comprimés
0 - 3 mois	2,5 - 5,4	5,5 - 11,9	Consulter un médecin	–	–	–
4 - 11 mois	5,5 - 7,9	12 - 17,5	1,0 ml	–	–	–
12 - 23 mois	8,0 - 10,8	18 - 23	1,4 ml	–	–	–
2 - 3 ans	10,9 - 15,9	24 - 35	3,0 ml	6,0 ml	1 ¼ c. à thé	1
4 - 5 ans	16,0 - 21,3	36 - 47	–	10 ml	2 c. à thé	1 ½
6 - 8 ans	21,4 - 26,7	48 - 59	–	12,5 ml	2 ½ c. à thé	2
9 - 10 ans	26,8 - 32,5	60 - 71	–	15,0 ml	3 c. à thé	2 ½
11 - 12 ans	32,6 - 43,0	72 - 95	–	19,0 ml	3 ¾ c. à thé	3
Si possible, déterminer la dose selon le poids, sinon, selon l'âge. Ne pas dépasser la dose recommandée sauf sur l'avis d'un médecin. Conserver tous les médicaments hors de portée des enfants.			Administrar toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 3 doses par jour	Administrar toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 3 doses par jour		Administrar toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 4 doses par jour

## Gouttes pédiatriques Advil®

Les gouttes pédiatriques Advil procurent aux enfants jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre et de la douleur associées au rhume, à l'immunisation ainsi qu'aux maux de gorge et d'oreilles.

● **PRÉCAUTION** : Garder hors de portée des enfants. Consulter un médecin si la fièvre ou la douleur dure pendant plus de 3 jours. Ne pas utiliser si l'enfant souffre de problèmes aux reins ou au foie, ou de déshydratation (importante perte de fluides) causée par des vomissements, la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides. Ne pas dépasser la dose recommandée sauf sur l'avis d'un médecin.

**MISE EN GARDE** : Ne pas administrer aux enfants prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant l'ibuprofène, ni à quiconque ayant manifesté une réaction allergique (difficulté à respirer, enflure, éruptions cutanées ou choc) après avoir pris de l'AAS, d'autres salicylates ou des médicaments anti-inflammatoires. En cas de surdosage, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin, même en l'absence de symptômes. Pour de plus amples renseignements, consulter la notice de conditionnement.

### Raisin - Sans colorant

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, saccharose, saveurs artificielles, sorbitol.

### Fruits

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, rouge FD&C no 40, saccharose, saveurs artificielles, sorbitol.

### Raisin

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, bleu FD&C no 1, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, rouge FD&C no 40, saccharose, saveurs artificielles, sorbitol.

## Suspension Advil® pour enfants

Advil pour enfants procure aux enfants jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre et de la douleur associées au rhume, à l'immunisation ainsi qu'aux maux de gorge et d'oreilles.

● **PRÉCAUTION** : Garder hors de portée des enfants. Consulter un médecin si la fièvre ou la douleur dure pendant plus de 3 jours. Ne pas utiliser si l'enfant souffre de problèmes aux reins ou au foie, ou de déshydratation (importante perte de fluides) causée par des vomissements, la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides. Ne pas dépasser la dose recommandée sauf sur l'avis d'un médecin.

**MISE EN GARDE** : Ne pas administrer aux enfants prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant l'ibuprofène, ni à quiconque ayant manifesté une réaction allergique (difficulté à respirer, enflure, éruptions cutanées ou choc) après avoir pris de l'AAS, d'autres salicylates ou des médicaments anti-inflammatoires. En cas de surdosage, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin, même en l'absence de symptômes. Pour de plus amples renseignements, consulter la notice de conditionnement.

### Raisin - Sans colorant

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, saccharose, saveur artificielle, sorbitol.

### Fruits

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, rouge FD&C no 40, saccharose, saveurs artificielles, sorbitol.

### Raisin

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, bleu FD&C no 1, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, rouge FD&C no 40, saccharose, saveur artificielle, sorbitol.

### Framboise bleue

**Ingrédients non médicinaux** : acide citrique, benzoate de sodium, bleu FD&C no 1, carboxyméthylcellulose de sodium, cellulose microcristalline, citrate de sodium, EDTA disodique, eau, glycérine, gomme de xanthane, polysorbate 80, saccharose, saveurs naturelles et artificielles, sorbitol.

## Comprimés à croquer Advil® Junior

Advil Junior procure aux enfants jusqu'à 8 heures de soulagement de la fièvre et de la douleur associées au rhume, à l'immunisation ainsi qu'aux maux de gorge et d'oreilles.

● **PRÉCAUTION** : Garder hors de portée des enfants. Consulter un médecin si la fièvre ou la douleur dure pendant plus de 3 jours. Ne pas utiliser si l'enfant souffre de problèmes aux reins ou au foie, ou de déshydratation (importante perte de fluides) causée par des vomissements, la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides. Ne pas dépasser la dose recommandée sauf sur l'avis d'un médecin.

**MISE EN GARDE** : Ne pas administrer aux enfants prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant l'ibuprofène, ni à quiconque ayant manifesté une réaction allergique (difficulté à respirer, enflure, éruptions cutanées ou choc) après avoir pris de l'AAS, d'autres salicylates ou des médicaments anti-inflammatoires. En cas de surdosage, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin, même en l'absence de symptômes. Pour de plus amples renseignements, consulter la notice de conditionnement.

### Fruit

**Ingrédients non médicinaux** : aspartame, cellulose microcristalline, dioxyde de silicium, gélatine, glycolate d'amidon de sodium, laque rouge D&C no 27, laque rouge FD&C no 40, magnasweet, mannitol, phthalate d'acétylcellulose, saveurs naturelles et artificielles, stéarate de magnésium.

### Raisin

**Ingrédients non médicinaux** : aspartame, cellulose microcristalline, dioxyde de silicium, gélatine, glycolate d'amidon de sodium, laque bleu FD&C no 2, laque rouge D&C no 30, magnasweet, mannitol, phthalate d'acétylcellulose, saveurs naturelles et artificielles, stéarate de magnésium.