



बच्चों की एडिवल

8 घंटे तक बुखार में आराम



एडिवल पिडियाट्रिक ड्रॉप्स आईबुप्रफेन 200 मिग्रा / 5 मिली	बच्चों का एडिवल सस्पेंशन आईबुप्रफेन 100 मिग्रा / 5 मिली	जुनियर स्ट्रैंथ एडिवल चियूएबल्स आईबुप्रफेन 100 मिग्रा / टेबलेट
--	---	--

आयु	वजन		खुराक			
	किग्रा	पाउंड	मिली	मिली	छोटा चम्मच	तालिका
0 - 3 माह	2.5 - 5.4	5.5 - 11.9	अपने डॉक्टर से पूछें	-	-	-
4 - 11 माह	5.5 - 7.9	12 - 17.5	1.0 मिली	-	-	-
12 - 23 माह	8.0 - 10.8	18 - 23	1.4 मिली	-	-	-
2 - 3 वर्ष	10.9 - 15.9	24 - 35	3.0 मिली	6.0 मिली	1 ¼ छो.च.	1
4 - 5 वर्ष	16.0 - 21.3	36 - 47	-	10 मिली	2 छो.च.	1 ½
6 - 8 वर्ष	21.4 - 26.7	48 - 59	-	12.5 मिली	2 ½ छो.च.	2
9 - 10 वर्ष	26.8 - 32.5	60 - 71	-	15.0 मिली	3 छो.च.	2 ½
11 - 12 वर्ष	32.6 - 43.0	72 - 95	-	19.0 मिली	3 ¾ छो.च.	3

यदि संभव हो, खुराक के लिए वजन अन्वया आयु प्रयोग करें। बताई गई खुराक से ज्यादा न लें जब तक डॉक्टर द्वारा न कहा जाए। सभी दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

प्रत्येक 6 से 8 घंटे में खुराक, एक दिन में 3 खुराकों तक

प्रत्येक 6 से 8 घंटे में खुराक, एक दिन में 3 खुराकों तक

प्रत्येक 6 से 8 घंटे में खुराक, एक दिन में 4 खुराकों तक

एड्रिवल पिडियाट्रिक ड्रॉप्स

एड्रिवल पिडियाट्रिक ड्रॉप्स बच्चों को बुखार में 8 घंटे तक का आराम प्रदान करती हैं और प्रतिरक्षण के कारण होने वाले दर्द, कान के दर्द, जुकाम और गले के दर्द में भी आराम देती हैं।

● **सावधानी:** बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि दर्द या बुखार 3 दिनों से अधिक तक रहे, डॉक्टर से सलाह लें। इसका प्रयोग न करें, यदि बच्चे को किडनी या लीवर की बीमारी हो अथवा उल्टी, अतिसार या लिए गए तरल पदार्थ के कारण निर्जलीय (महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की कमी) हो जाए। डॉक्टर से सलाह लिए बिना सिफारिश की गई खुराक को बढ़ाएं नहीं।

चेतावनी: एसिटाइलसेलिसाइलिक अम्ल (एएसए) अथवा आईबुप्रफेन युक्त अन्य उत्पाद लेने वाले या एएसए, अन्य सेलिसाइलेट या ज्वलन-रोधी दवाएं प्रयोग करने के बाद अलर्जी प्रतिक्रिया (सांस लेने में परेशानी, सूजन, पित्ती या सदमा) वाले बच्चों को न दें। अत्याधिक खुराक के मामले में, तुरंत वि। नियंत्रण केंद्र या डॉक्टर को बुलाएं चाहे कोई भी लक्षण न हो। अधिक जानकारी के लिए, इसमें मौजूद पैकेज देखें।

(डाई मुक्त)

गैर-चिकित्सीय तत्व: कृत्रिम प्लेवर, साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

(फल)

गैर-चिकित्सीय तत्व: कृत्रिम प्लेवर, साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, एफडीएवंसी लाल सं. 40, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

(अंगूर)

गैर-चिकित्सीय तत्व: कृत्रिम प्लेवर, साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, एफडीएवंसी नीला सं. 1, एफडीएवंसी लाल सं. 40, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

बच्चों का एड्रिवल सस्पेंशन

बच्चों की एड्रिवल बच्चों को बुखार में 8 घंटे तक का आराम प्रदान करती हैं और प्रतिरक्षण के कारण होने वाले दर्द और कान के दर्द, जुकाम और गले के दर्द में भी आराम देती हैं।

● **सावधानी:** बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि दर्द या बुखार 3 दिनों से अधिक तक रहे, डॉक्टर से सलाह लें। इसका प्रयोग न करें, यदि बच्चे को किडनी या लीवर की बीमारी हो अथवा उल्टी, अतिसार या लिए गए तरल पदार्थ के कारण निर्जलीय (महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की कमी) हो जाए। डॉक्टर से सलाह लिए बिना सिफारिश की गई खुराक को बढ़ाएं नहीं।

चेतावनी: एसिटाइलसेलिसाइलिक अम्ल (एएसए) अथवा आईबुप्रफेन युक्त अन्य उत्पाद लेने वाले, या एएसए, अन्य सेलिसाइलेट या ज्वलन-रोधी दवाएं प्रयोग करने के बाद अलर्जी प्रतिक्रिया (सांस लेने में परेशानी, सूजन, पित्ती या सदमा) वाले बच्चों को न दें। अत्याधिक खुराक के मामले में, तुरंत वि। नियंत्रण केंद्र या डॉक्टर को बुलाएं चाहे कोई भी लक्षण न हो। अधिक जानकारी के लिए, इसमें मौजूद पैकेज देखें।

(डाई मुक्त)

गैर-चिकित्सीय तत्व: कृत्रिम प्लेवर, साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

(फल)

गैर-चिकित्सीय तत्व: कृत्रिम प्लेवर, साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, एफडीएवंसी लाल सं. 40, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

(अंगूर)

गैर-चिकित्सीय तत्व: साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, एफडीएवंसी नीला सं. 1, एफडीएवंसी लाल सं. 40, कृत्रिम प्लेवर, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

(नीली रसम (री))

गैर-चिकित्सीय तत्व: साइट्रिक अम्ल, डिसोडियम ईडीटीए, एफडीएवंसी नीला सं. 1, ग्लिसरीन, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, प्राकृतिक और कृत्रिम प्लेवर, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम बेन्जोएट, सोडियम कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोस, सोडियम सिट्रेट, सॉर्बिटोल, कार्बरा, जल, जैनथन गम।

जुनियर स्ट्रॉथ एड्रिवल चियूएबल्स

जुनियर स्ट्रॉथ एड्रिवल बच्चों को बुखार में 8 घंटे तक का आराम प्रदान करती हैं और प्रतिरक्षण के कारण होने वाले दर्द और कान के दर्द, जुकाम और गले के दर्द में भी आराम देती हैं।

● **सावधानी:** बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि दर्द या बुखार 3 दिनों से अधिक तक रहे, डॉक्टर से सलाह लें। इसका प्रयोग न करें, यदि बच्चे को किडनी या लीवर की बीमारी हो अथवा उल्टी, अतिसार या लिए गए तरल पदार्थ के कारण निर्जलीय (महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की कमी) हो जाए। डॉक्टर से सलाह लिए बिना सिफारिश की गई खुराक को बढ़ाएं नहीं।

चेतावनी: एसिटाइलसेलिसाइलिक अम्ल (एएसए) अथवा आईबुप्रफेन युक्त अन्य उत्पाद लेने वाले, या एएसए, अन्य सेलिसाइलेट या ज्वलन-रोधी दवाएं प्रयोग करने के बाद अलर्जी प्रतिक्रिया (सांस लेने में परेशानी, सूजन, पित्ती या सदमा) वाले बच्चों को न दें। अत्याधिक खुराक के मामले में, तुरंत वि। नियंत्रण केंद्र या डॉक्टर को बुलाएं चाहे कोई भी लक्षण न हो। **अधिक जानकारी के लिए, इसमें मौजूद पैकेज देखें।**

(फल)

गैर-चिकित्सीय तत्व: एस्पारटेम, सेलुलोस एसिटेट, थैलेट, डीएवंसी लाल सं. 27 लेक, एफडीएवंसी लाल सं. 40 लेक, जिलेटिन, मैग्नास्वीट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, मनीटोल, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, प्राकृतिक और कृत्रिम प्लेवर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट।

(अंगूर)

गैर-चिकित्सीय तत्व: एस्पारटेम, सेलुलोस एसिटेट, थैलेट, डीएवंसी लाल सं. 30 लेक, एफडीएवंसी लाल सं. 2 लेक, जिलेटिन, मैग्नास्वीट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, मनीटोल, माइक्रोक्राइस्टैलाइन सेलुलोस, प्राकृतिक और कृत्रिम प्लेवर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट।